



Disponible en ligne sur [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)



TRAVAIL ORIGINAL

## Enquête sur le tabagisme au cours de la grossesse dans l'agglomération versaillaise

### Investigation on smoking during pregnancy in the Versailles suburbs

P. Raynal<sup>a,\*</sup>, P. Panel<sup>a,c</sup>, F. Fuchs<sup>a</sup>, E. Dautzenberg<sup>a</sup>, U. Metzger<sup>b,c</sup>, M. Toledano<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Service de gynécologie-obstétrique, hôpital André-Mignot, centre hospitalier de Versailles, 177, rue de Versailles, 78150 Le Chesnay, France

<sup>b</sup> Centre européen de diagnostic et d'exploration de la femme, 15, rue Pottier, 78150 Le Chesnay, France

<sup>c</sup> Communauté périnatale de l'agglomération versaillaise, 29, rue de Versailles, 78150 Le Chesnay, France

Reçu le 24 février 2007 ; avis du comité de lecture le 5 mai 2007 ; définitivement accepté le 27 juin 2007

Disponible sur Internet le 19 novembre 2007

#### MOTS CLÉS

Grossesse ;  
Tabagisme ;  
Sevrage ;  
Épidémiologie

#### Résumé

**Objectif.** – Faire un état des lieux du tabagisme, actif et passif, dans une population de femmes enceintes de l'agglomération versaillaise (Yvelines) avant la mise en place d'ateliers de sevrage tabagique.

**Matériels et méthode.** – Il s'agit d'une enquête descriptive par autoquestionnaire sur un échantillon de 1006 femmes enceintes menée dans la Communauté périnatale de l'agglomération versaillaise (CPAV) qui est un réseau de santé de proximité. Les variables analysées concernent les caractéristiques maternelles lors de la grossesse, les habitudes tabagiques avant et pendant la grossesse, l'existence d'un conjoint fumeur et d'une exposition professionnelle au tabagisme passif, la connaissance des risques liés au tabagisme et l'existence d'une aide au sevrage tabagique.

**Résultats.** – Quatorze pour cent de femmes enceintes fument au cours de la grossesse, 9% sont exposées à un tabagisme passif sur leur lieu de travail et 20% vivent avec un conjoint fumeur. Quatre-vingt pour cent des femmes fumeuses ont diminué la consommation de tabac au cours de la grossesse et 40% d'entre elles ont souhaité une aide pour un sevrage tabagique.

*Abréviations:* CPAV, Communauté périnatale de l'agglomération versaillaise ;NS, non-significatif.

\* Auteur correspondant.

Adresses e-mail [praynal@ch-versailles.fr](mailto:praynal@ch-versailles.fr), [cpav@wanadoo.fr](mailto:cpav@wanadoo.fr) (P. Raynal).